

Mebendazole
OZIBEN[®]
100 MG Comprimés
500 MG Comprimé

COMPOSITION

- Oziben[®] 100 mg - comprimés** : mébendazole : 100 mg pour un comprimé
- Oziben[®] 500 mg - comprimé** : mébendazole : 500 mg pour un comprimé

FORMES ET PRÉSENTATIONS

- Oziben[®] 100 mg - comprimés** : boîte de 6 comprimés
- Oziben[®] 500 mg - comprimé** : boîte de 1 comprimé

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

Antiparasitaire / anthelminthique

INDICATIONS

Oziben[®] est un médicament contre les vers parasites. Il est indiqué dans le traitement des infestations par une ou plusieurs des espèces suivantes :

- oxyures (Enterobius vermicularis),
- trichocéphales (Trichuris trichiuria),
- ascaris (Ascaris lumbricoides),
- ankylostome (Ancylostoma duodenale, Necator americanus),
- anguillules (Strongyloides stercoralis),
- tenia (Taenia spp.).

MISE EN GARDE

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?

Ne pas utiliser Oziben[®] en cas d’hypersensibilité (allergie) au mébendazole.

En cas de doute, il est indispensable de demander l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser ce médicament avec précaution chez les enfants de moins de 2 ans : Oziben[®] ne peut-être donné aux enfants de moins de 2 ans que sur prescription médicale. En cas de doute, ne pas hésiter à demander l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Informez votre médecin en cas de prise de cimétidine (médicament contre l’acidité de l’estomac), celui-ci pourra être amené à adapter la posologie. Afin d’éviter d’éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

En cas de grossesse, informez votre médecin qui décidera si vous pouvez prendre Oziben[®]. En cas d’allaitement, consultez d’abord votre médecin qui décidera si vous pouvez prendre Oziben[®]. D’une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l’allaitement de toujours demander l’avis à votre médecin ou de votre pharmacien avant d’utiliser un médicament.

POSOLOGIE

Le mébendazole étant très peu absorbé dans l’intestin, la posologie sera la même chez les adultes et les enfants de plus de 2 ans. La posologie est variable selon les espèces respon-sables de l’infestation.

• **Oziben[®] 100 mg - comprimés** :

***Oxyurose** :*

1 comprimé matin et soir, à renouveler 2 à 4 semaines plus tard. Le premier traitement tue les vers, mais pas les oeufs, ces oeufs pouvant causer une nouvelle infestation, le deuxième traitement est nécessaire pour éliminer complètement l’infestation.

***Ascariidiose, trichocéphalose, ankylostomose, infections mixtes** :*

1 comprimé matin et soir pendant 3 jours.

***Téniase et anguillulose** :*

1 comprimé matin et soir pendant 6 jours.

• **Oziben[®] 500 mg - comprimé** :

Chez les adultes et les enfants de plus de 5 ans, l’administration répétée de comprimés à 100 mg peut être remplacée par une administration unique d’un comprimé à 500 mg. La posologie habituelle est de 500 mg en une prise, à renouveler une fois au bout de 3 semaines si l’infestation persiste.

MODE D'EMPLOI ET VOIE D'ADMINISTRATION

Comprimés à prendre par la bouche avec un liquide.

FRÉQUENCE ET MOMENT AUQUEL

LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

Il n’est pas nécessaire de prendre Oziben[®] avec des aliments : on peut le prendre à jeun. Aucune précaution alimentaire n’est nécessaire et il n’est pas utile de prendre des laxatifs : les vers s’élimineront d’eux-mêmes ou seront digérés.

CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

En cas de prise d’une quantité excessive d’Oziben[®], se rappeler d’abord que le produit est très peu absorbé dans l’intestin ; consultez votre médecin. Un traitement par le charbon activé est généralement indiqué.

EFFETS INDÉSIRABLES

Oziben[®] est généralement bien toléré et peu d’effets indésirables ont été rapportés aux doses prescrites. Des douleurs abdominales et des diarrhées passagères peuvent survenir, en particulier en cas d’infestation massive. Dans ce cas, il faut poursuivre le traitement. Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet indésirable ou gênant qui vous semblerait en rapport avec la prise du produit et qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

CONSERVATION

Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Titulaire / Exploitant :

NYD PHARMA (agrée Swissmedic)

16 rue du Mont Blanc - 1201 Genève - SUISSE

www.nydpharma.com

Fabricant : Coral Laboratories Ltd.,India

Neutral code : DD/DRUGS/DD/409

Date de révision de la notice :

Janvier 2011.

Oziben[®] est une marque déposée de Nyd Pharma

Mebendazole
OZIBEN[®]
30 ML Suspension buvable

COMPOSITION

Mébendazole : 100 mg pour une cuillerée à café de suspension (5 ml).

Agents conservateurs : methylparaben 0,2%, propylparaben 0,02%

FORME ET PRÉSENTATION

Flacon de 30 ml contenant 600 mg de mebendazole, avec gobelet doseur gradué.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

Antiparasitaire / anthelminthique

INDICATIONS

Oziben[®] est un médicament contre les vers parasites. Il est indiqué dans le traitement des infestations par une ou plusieurs des espèces suivantes :

- oxyures (Enterobius vermicularis),
- trichocéphales (Trichuris trichiuria),
- ascaris (Ascaris lumbricoides),
- ankylostome (Ancylostoma duodenale, Necator americanus),
- anguillules (Strongyloides stercoralis),
- tenia (Taenia spp.).

MISE EN GARDE

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?

Ne pas utiliser Oziben[®] en cas d’hypersensibilité (allergie) au Mebendazole et aux parabens (agents conservateurs).

En cas de doute, il est indispensable de demander l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser ce médicament avec précaution chez les enfants de moins de 2 ans : Oziben[®] ne peut-être donné aux enfants de moins de 2 ans que sur prescription médicale. En cas de doute, ne pas hésiter à demander l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Informez votre médecin en cas de prise de cimétidine (médicament contre l’acidité de l’estomac), celui-ci pourra être amené à adapter la posologie.

Afin d’éviter d’éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

En cas de grossesse, informez votre médecin qui décidera si vous pouvez prendre Oziben[®].

En cas d’allaitement, consultez d’abord votre médecin qui décidera si vous pouvez prendre Oziben[®]. D’une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l’allaitement de toujours demander l’avis à votre médecin ou de votre pharmacien avant d’utiliser un médicament.

POSOLOGIE

Le mebendazole étant très peu absorbé dans l’intestin, la posologie sera la même chez les adultes et les enfants de plus de 2 ans. La posologie est variable selon les espèces responsables de l’infestation.

• ***Oxyurose** :*

5 ml matin et soir dans la même journée, à renouveler 2 à 4 semaines plus tard. Le premier traitement tue les vers, mais pas les œufs, ces œufs pouvant causer une nouvelle infestation, le deuxième traitement est nécessaire pour éliminer complètement l’infestation.

• ***Ascariidiose, trichocéphalose, ankylostomose, infections mixtes** :*

5 ml matin et soir pendant 3 jours consécutifs, à renouveler 2 à 4 semaines plus tard.

• ***Téniase et anguillulose** :*

5 ml matin et soir pendant 6 jours consécutifs.

MODE D'EMPLOI ET VOIE D'ADMINISTRATION

Liquide à prendre par la bouche.

FRÉQUENCE ET MOMENT AUQUEL

LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

Il n’est pas nécessaire de prendre Oziben[®] avec des aliments : on peut le prendre à jeun. Aucune précaution alimentaire n’est nécessaire et il n’est pas utile de prendre des laxatifs : les vers s’élimineront d’eux-mêmes ou seront digérés.

CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

En cas de prise d’une quantité excessive d’Oziben[®], se rappeler d’abord que le produit est très peu absorbé dans l’intestin ; consultez votre médecin. Un traitement par le charbon activé est généralement indiqué.

EFFETS INDÉSIRABLES

Oziben[®] est généralement bien toléré et peu d’effets indésirables ont été rapportés aux doses prescrites. Des douleurs abdominales et des diarrhées passagères peuvent survenir, en particulier en cas d’infestation massive. Dans ce cas, il faut poursuivre le traitement. Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet indésirable ou gênant qui vous semblerait en rapport avec la prise du produit et qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

CONSERVATION

Conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Titulaire / Exploitant :

NYD PHARMA (agrée Swissmedic)

16 rue du Mont Blanc - 1201 Genève - SUISSE

www.nydpharma.com

Fabricant : SANPRAS HEALTH CARE PVT. LTD.

81, S.T.I.C.E., Musalgaon, Tal. Sinar, Dist - Nashik 422112, Inde

Neutral code : MH/25/NKD/108

Date de révision de la notice :

Janvier 2011.

Oziben[®] est une marque déposée de Nyd Pharma

Mebendazole
OZIBEN[®]
200 MG Sachets

COMPOSITION

Mébendazole : 200 mg pour un sachet

FORMES ET PRÉSENTATIONS

Boîte de 3 sachets

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

Antiparasitaire / anthelminthique

INDICATIONS

Oziben[®] est un médicament contre les vers parasites. Il est indiqué dans le traitement des infestations par une ou plusieurs des espèces suivantes :

- oxyures (Enterobius vermicularis),
- trichocéphales (Trichuris trichiuria),
- ascaris (Ascaris lumbricoides),
- ankylostome (Ancylostoma duodenale, Necator americanus),
- anguillules (Strongyloides stercoralis),
- tenia (Taenia spp.).

MISE EN GARDE

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?

Ne pas utiliser Oziben[®] en cas d’hypersensibilité (allergie) au mébendazole.

En cas de doute, il est indispensable de demander l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser ce médicament avec précaution chez les enfants de moins de 2 ans : Oziben[®] ne peut-être donné aux enfants de moins de 2 ans que sur prescription médicale. En cas de doute, ne pas hésiter à demander l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Informez votre médecin en cas de prise de cimétidine (médicament contre l’acidité de l’estomac), celui-ci pourra être amené à adapter la posologie. Afin d’éviter d’éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

En cas de grossesse, informez votre médecin qui décidera si vous pouvez prendre Oziben[®]. En cas d’allaitement, consultez d’abord votre médecin qui décidera si vous pouvez prendre Oziben[®]. D’une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l’allaitement de toujours demander l’avis à votre médecin ou de votre pharmacien avant d’utiliser un médicament.

POSOLOGIE

Le mébendazole étant très peu absorbé dans l’intestin, la posologie sera la même chez les adultes et les enfants de plus de 2 ans. La posologie est variable selon les espèces respon-sables de l’infestation.

***Oxyurose** :*

1 sachet à renouveler 2 à 4 semaines plus tard. Le premier traitement tue les vers, mais pas les oeufs, ces oeufs pouvant causer une nouvelle infestation, le deuxième traitement est nécessaire pour éliminer complètement l’infestation.

***Ascariidiose, trichocéphalose, ankylostomose, infections mixtes** :*

1 sachet par jour pendant 3 jours.

***Téniase et anguillulose** :*

1 sachet par jour pendant 6 jours.

MODE D'EMPLOI ET VOIE D'ADMINISTRATION

Sachet à prendre par la bouche,

directement ou avec un liquide.

FRÉQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

Il n’est pas nécessaire de prendre Oziben[®] avec des aliments : on peut le prendre à jeun. Aucune précaution alimentaire n’est nécessaire et il n’est pas utile de prendre des laxatifs : les vers s’élimineront d’eux-mêmes ou seront digérés.

CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

En cas de prise d’une quantité excessive d’Oziben[®], se rappeler d’abord que le produit est très peu absorbé dans l’intestin ; consultez votre médecin. Un traitement par le charbon activé est généralement indiqué.

EFFETS INDÉSIRABLES

Oziben[®] est généralement bien toléré et peu d’effets indésirables ont été rapportés aux doses prescrites. Des douleurs abdominales et des diarrhées passagères peuvent survenir, en particulier en cas d’infestation massive. Dans ce cas, il faut poursuivre le traitement. Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet indésirable ou gênant qui vous semblerait en rapport avec la prise du produit et qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

CONSERVATION

Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Titulaire / Exploitant :

NYD PHARMA (agrée Swissmedic)

16 rue du Mont Blanc - 1201 Genève - SUISSE

www.nydpharma.com

Fabricant : Helios Pharmaceuticals. Vill. Malpur, P.O. Bhud, Baddi,

Teh. Nalagarh, Dist. Solan, H.P. - 173 205. Inde

Neutral code : HP/05/469

Date de révision de la notice :

Janvier 2011.

Oziben[®] est une marque déposée de Nyd Pharma