

Alpha vit® 120 ml *siróp*

COMPOSITION : pour une cuillère à café (5ml)

Retinol palmitate synthétique (DCI)
 ou Vitamine A 3000 U.I.
 Cholécalciférol (DCI) ou vitamine D3 500 U.I.
 Thiamine chlorhydrate (DCI) ou Vitamine B1 2 mg
 Riboflavine Phosphate Sodique (DCI)
 ou Vitamine B2 équivalent à riboflavine 1,2 mg
 Nicotinamide (DCI) ou vitamine PP 10 mg
 Pyridoxine Chlorhydrate (DCI) ou vitamine B6 1 mg
 Cyanocobalamine (DCI) ou Vitamine B12 2,5 µg
 Acide ascorbique (DCI) ou vitamine C 40 mg
 Excipient q.s.p. 5 ml

FORME PHARMACEUTIQUE :

Siróp - Flacon de 120 ml avec gobelet doseur gradué

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE :

POLYVITAMINES NON ASSOCIÉES.

(A : appareil digestif et métabolisme)

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT :

(indications thérapeutiques)

ALPHA VIT est une association de vitamines.

Il est préconisé dans la prévention et la correction des carences vitaminiques liées à une alimentation déséquilibrée ou insuffisante chez l'adulte, l'adolescent et l'enfant à partir de 6 mois.

POSOLOGIE :

- Adulte et adolescent : 5 à 10 ml par jour.
- Enfant de 1 an à 15 ans : 2,5 à 5 ml par jour.
- Nourrisson de 6 mois à 1 an : 2,5 ml par jour.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

En raison de la présence de vitamine A et de vitamine D, tenir compte des doses administrées en cas d'association avec d'autres préparations contenant déjà ces vitamines. Ce médicament contient du sucre, en tenir compte en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète. Chez l'enfant de moins de 6 mois, un avis médical est nécessaire.

Tous les besoins en vitamines sont couverts par une alimentation équilibrée et diversifiée avec les aliments de base traditionnels (fruits, légumes, viandes, œufs, poissons, céréales, produits laitiers).

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISE EN GARDE SPÉCIALE :

Certaines vitamines de cette formule provoque une coloration des urines en jaune, ne pas s'inquiéter.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

ET AUTRES INTERACTIONS :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il est conseillé de signaler tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE-ALLAITEMENT :

Il est d'usage d'une façon générale, au cours de la grossesse ou de l'allaitement, de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Voie orale. Agiter avant emploi.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants. Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant que vous pourriez rencontrer.

CONSERVATION :

Conservé en-dessous de 25°C. Protéger de la lumière. Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Ceci est un médicament.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Exploitant : NYD PHARMA (agréé Swissmedic)

2 place du Port - 1204 Genève - SUISSE

www.nydpharma.com

Fabricant : CIPLA Ltd.

Date de révision de la notice :

Janvier 2013