

alvir[®] 5% crème

aciclovir

Antiviral pour usage local

Composition : Aciclovir : 5 % et excipients dont propylène glycol q.s.p.

Forme pharmaceutique : Crème - Tube de 5 g

Indications : L'aciclovir est un antiviral puissant préconisé dans le traitement des manifestations herpétiques au niveau de la peau, des lèvres ou des organes génitaux.

Contre-indication : ALVIR 5% crème ne doit pas être utilisé en cas d'allergie connue à l'aciclovir ou au propylène glycol. L'application directe de la crème dans la bouche, dans le vagin et particulièrement dans l'œil est contre-indiquée.

Interactions médicamenteuses : Il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien afin d'éviter d'éventuelles interactions.

Grossesse et allaitement : En cas de grossesse ou d'allaitement, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Posologie et fréquence d'administration : 5 applications régulièrement réparties dans la journée. Appliquer en débordant largement autour de la lésion. Le traitement doit être débuté le plus tôt possible, dès les premiers signes de l'infection.

Mode et voie d'administration : Voie cutanée.

Durée du traitement : Suivre la prescription médicale. La durée du traitement est comprise en général entre 5 et 10 jours.

Effets indésirables : Troubles bénins : sensation de picotements ou de brûlures transitoires. Rarement prurit, éruption cutanée, rougeur ou sécheresse de la peau.

Conservation : Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur la boîte. Conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Exploitant : NYD PHARMA (agrée Swissmedic)
2 place du Port - 1204 Genève - SUISSE.

www.nydpharma.com - Fabricant : CIPLA Ltd.

Date de révision de la notice :
Septembre 2011