

# Oradroxyl<sup>®</sup> 250 mg / 5 ml Suspension buvable

CEFADROXIL

ANTIBIOTIQUE de la famille des bêta-lactamines, du groupe des céphalosporines de première génération.

## Composition

Céfadroxil : 250 mg pour une cuillerée à café de suspension (5 ml).

Excipients : q.s.p. 5 ml

## Forme pharmaceutique

Suspension buvable - Flacon de 60 ml avec gobelet doseur gradué

## Indications

Oradroxyl est indiqué dans le traitement de certaines infections bactériennes à germes sensibles. Infections ORL (causées par les Streptocoques de groupe A bêta-hémolytique), infections dermatologiques et respiratoires (causées par les Staphylocoques et le Streptococcus pneumoniae), infections urinaires (causées par E.coli, P. mirabilis et Klebsiella).

## Contre-indications

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

En cas d'allergie aux antibiotiques du groupe des céphalosporines ou à l'un des constituants du produit.

En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## Précautions d'emploi

Prévenez votre médecin en cas d'insuffisance rénale.

## Interactions médicamenteuses

Il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien et ce, afin d'éviter d'éventuelles interactions.

## Posologie

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé aux doses prescrites.

La posologie doit être adaptée en cas d'insuffisance rénale.

## Mode et voie d'administration

Voie orale.

## Durée du traitement

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé aussi longtemps que votre médecin vous l'aura recommandé.

## Effets indésirables

Comme tout produit actif, ce médicament peut chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :

- manifestations digestives : nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhées ;
- élévation des transaminases sériques (ASAT, ALAT) ;
- neutropénies réversibles modérées ;
- réactions allergiques : urticaire, démangeaisons.

## Conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

## Exploitant :

NYD PHARMA (agréé Swissmedic)

2 place du Port - 1204 Genève - SUISSE

[www.nydpharma.com](http://www.nydpharma.com)

Fabricant : CIPLA Ltd.

Date de révision de la notice : janvier 2013

