

ROXYL[®] 300 mg 5 comprimés enrobés

ROXITHROMYCINE

Antibiotique de la famille des macrolides.

Composition

Roxithromycine : 300 mg

Excipients : q.s.p. 1 comprimé.

Forme pharmaceutique

Blister de 5 comprimés enrobés.

Indications

ROXYL est un antibiotique qui appartient à la famille des macrolides ; il est indiqué dans le traitement de certaines infections bactériennes à germes sensibles, notamment celles de la gorge, des sinus, des poumons, des bronches, de la peau et de l'appareil génital.

Contre-indications

La Roxithromycine ne doit pas être utilisée dans les cas suivants :

- allergie connue aux macrolides,
- en association avec l'ergotamine et la dihydroergotamine (médicaments antimigraineux),
- en association avec le cisapride (médicament antireflux).

Précaution d'emploi

Prévenir votre médecin en cas d'insuffisance hépatique.

Interactions médicamenteuses

Il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien notamment en cas de prise de bromocriptine, de ciclosporine, de théophylline, d'ergotamine, de dihydroergotamine et de cisapride et ce, afin d'éviter d'éventuelles interactions.

Grossesse et allaitement

En cas de grossesse ou d'allaitement, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Conducteurs et utilisateurs de machines

Risques de sensations vertigineuses pouvant rendre dangereuse la conduite automobile ou l'utilisation de machines.

Posologie

Pour l'adulte, la dose recommandée est de 300 mg/jour.

La roxithromycine sera prise de préférence avant les repas (15 minutes avant).

Mode et voie d'administration

Voie orale. A prendre avec un verre d'eau.

Durée du traitement

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé aux doses prescrites et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura indiqué.

A titre indicatif, la durée du traitement est en général de 5 à 10 jours.

Effets indésirables

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :

- Manifestations digestives : nausées, vomissements, douleurs d'estomac, diarrhées.
- Vertiges, maux de tête, anomalies de la perception de la sensation du toucher.
- Augmentation transitoire possible des transaminases hépatiques (ASAT, ALAT).
- Réactions allergiques :
 - éruption cutanée, urticaire,
 - exceptionnellement purpura (« bleu ») ou petites taches rouges sur la peau et réactions sévères type œdème de Quincke et gêne respiratoire.

Conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur la boîte.

Exploitant : NYD PHARMA (agrée Swissmedic)

2 place du Port - 1204 Genève - SUISSE

www.nydpharma.com

Fabricant : CIPLA Ltd.

Date de révision de la notice : janvier 2013