

DIARRHÉES DU NOURRISSON ET DE L'ENFANT




Dans le monde
aujourd'hui

*1,6 millions
de décès par an*

un enjeu majeur
de Santé Public

En association avec une réhydratation orale,
efficacité dès l'âge de 1 mois

Diminution significative
du débit des selles*



antidiarrhéique de référence

Réduction de la durée de l'épisode diarrhéique

Groupe Racécadotril

Groupe Placebo



50% des enfants inclus dans l'étude sont guéris

7H après la prise

versus 36H dans le groupe placebo

Efficacité anti diarrhéique quelque
soit l'étiologie, y compris rotavirus



HYDRAVIT[®]

RACÉCADOTRIL

1^{er} anti sécrétoire intestinal pur,
agissant par inhibition de l'enképhalinase



Organisation
mondiale de la Santé



Dès
1 mois

1^{er} jour

Les jours
suivants

(sans dépasser 7 jours)

De 1 mois à 9 kg

1 sachet tout de suite
puis
1 sachet matin + midi + soir

1 sachet matin + midi + soir

De 9 kg à 13 kg

2 sachets tout de suite
puis
2 sachets matin + midi + soir

2 sachets matin + midi + soir



Agréé SWISSMEDIC

France : 92 Avenue du Général Leclerc - 92100 Boulogne Billancourt
Suisse : 16 rue du Mont Blanc - 1201 Genève
www.nydpharma.com e-Mail : contact@nyd.com